ES

Premier® Tastytooth™ Varnish

Barniz de fluoruro sódico al 5%

Instrucciones para el cuidado del paciente después del tratamiento

Su dentista/higienista bucal le ha aplicado una capa terapéutica de barniz Tastytooth sobre la superficie de varios dientes. Lo podrá notar como una delgada película blanca sobre la superficie del diente. El residuo de la película es temporal y debe dejarlo para obtener los mejores resultados terapéuticos en las áreas tratadas.
A fin de obtener el máximo beneficio de la aplicación del barniz, le recomendamos lo siguiente:

- El barniz Tastytooth debe permanecer en los dientes aproximadamente de 4 a 6 horas. No se cepille los dientes ni use hilo dental durante este período de tratamiento.
- Ingiera alimentos blandos y evite las bebidas calientes y los productos que contengan alcohol durante el período de tratamiento.
- Evite productos con fluoruro como pastas, geles y enjuagues bucales. Al día siguiente, podrá reanudar la higiene bucal normal.
- El uso de fluoruro suplementario recetado debe interrumpirse de 2 a 3 días después del tratamiento (a menos que su dentista o médico le indiquen lo contrario).

Un buen cepillado y el uso de hilo dental eliminarán todos los restos de barniz Tastytooth de los dientes una vez finalizado el tratamiento. Después del cepillado, los dientes retomarán su aspecto y brillo normal.

DFU 90785 031748 Rev1 PDF

ES

Premier® Tastytooth™ Varnish

Barniz de fluoruro sódico al 5%

Instrucciones para el cuidado del paciente después del tratamiento

Su dentista/higienista bucal le ha aplicado una capa terapéutica de barniz Tastytooth sobre la superficie de varios dientes. Lo podrá notar como una delgada película blanca sobre la superficie del diente. El residuo de la película es temporal y debe dejarlo para obtener los mejores resultados terapéuticos en las áreas tratadas.
A fin de obtener el máximo beneficio de la aplicación del barniz, le recomendamos lo siguiente:

- El barniz Tastytooth debe permanecer en los dientes aproximadamente de 4 a 6 horas. No se cepille los dientes ni use hilo dental durante este período de tratamiento.
- Ingiera alimentos blandos y evite las bebidas calientes y los productos que contengan alcohol durante el período de tratamiento.
- Evite productos con fluoruro como pastas, geles y enjuagues bucales. Al día siguiente, podrá reanudar la higiene bucal normal.
- El uso de fluoruro suplementario recetado debe interrumpirse de 2 a 3 días después del tratamiento (a menos que su dentista o médico le indiquen lo contrario).

Un buen cepillado y el uso de hilo dental eliminarán todos los restos de barniz Tastytooth de los dientes una vez finalizado el tratamiento. Después del cepillado, los dientes retomarán su aspecto y brillo normal.

DFU 90785 031748 Rev1 PDF

ES

Premier® Tastytooth™ Varnish

Barniz de fluoruro sódico al 5%

Instrucciones para el cuidado del paciente después del tratamiento

Su dentista/higienista bucal le ha aplicado una capa terapéutica de barniz Tastytooth sobre la superficie de varios dientes. Lo podrá notar como una delgada película blanca sobre la superficie del diente. El residuo de la película es temporal y debe dejarlo para obtener los mejores resultados terapéuticos en las áreas tratadas.
A fin de obtener el máximo beneficio de la aplicación del barniz, le recomendamos lo siguiente:

- El barniz Tastytooth debe permanecer en los dientes aproximadamente de 4 a 6 horas. No se cepille los dientes ni use hilo dental durante este período de tratamiento.
- Ingiera alimentos blandos y evite las bebidas calientes y los productos que contengan alcohol durante el período de tratamiento.
- Evite productos con fluoruro como pastas, geles y enjuagues bucales. Al día siguiente, podrá reanudar la higiene bucal normal.
- El uso de fluoruro suplementario recetado debe interrumpirse de 2 a 3 días después del tratamiento (a menos que su dentista o médico le indiquen lo contrario).

Un buen cepillado y el uso de hilo dental eliminarán todos los restos de barniz Tastytooth de los dientes una vez finalizado el tratamiento. Después del cepillado, los dientes retomarán su aspecto y brillo normal.

DFU 90785 031748 Rev1 PDF

ES

Premier® Tastytooth™ Varnish

Barniz de fluoruro sódico al 5%

Instrucciones para el cuidado del paciente después del tratamiento

Su dentista/higienista bucal le ha aplicado una capa terapéutica de barniz Tastytooth sobre la superficie de varios dientes. Lo podrá notar como una delgada película blanca sobre la superficie del diente. El residuo de la película es temporal y debe dejarlo para obtener los mejores resultados terapéuticos en las áreas tratadas.
A fin de obtener el máximo beneficio de la aplicación del barniz, le recomendamos lo siguiente:

- El barniz Tastytooth debe permanecer en los dientes aproximadamente de 4 a 6 horas. No se cepille los dientes ni use hilo dental durante este período de tratamiento.
- Ingiera alimentos blandos y evite las bebidas calientes y los productos que contengan alcohol durante el período de tratamiento.
- Evite productos con fluoruro como pastas, geles y enjuagues bucales. Al día siguiente, podrá reanudar la higiene bucal normal.
- El uso de fluoruro suplementario recetado debe interrumpirse de 2 a 3 días después del tratamiento (a menos que su dentista o médico le indiquen lo contrario).

Un buen cepillado y el uso de hilo dental eliminarán todos los restos de barniz Tastytooth de los dientes una vez finalizado el tratamiento. Después del cepillado, los dientes retomarán su aspecto y brillo normal.

DFU 90785 031748 Rev1 PDF

ES

Premier® Tastytooth™ Varnish

Barniz de fluoruro sódico al 5%

Instrucciones para el cuidado del paciente después del tratamiento

Su dentista/higienista bucal le ha aplicado una capa terapéutica de barniz Tastytooth sobre la superficie de varios dientes. Lo podrá notar como una delgada película blanca sobre la superficie del diente. El residuo de la película es temporal y debe dejarlo para obtener los mejores resultados terapéuticos en las áreas tratadas.
A fin de obtener el máximo beneficio de la aplicación del barniz, le recomendamos lo siguiente:

- El barniz Tastytooth debe permanecer en los dientes aproximadamente de 4 a 6 horas. No se cepille los dientes ni use hilo dental durante este período de tratamiento.
- Ingiera alimentos blandos y evite las bebidas calientes y los productos que contengan alcohol durante el período de tratamiento.
- Evite productos con fluoruro como pastas, geles y enjuagues bucales. Al día siguiente, podrá reanudar la higiene bucal normal.
- El uso de fluoruro suplementario recetado debe interrumpirse de 2 a 3 días después del tratamiento (a menos que su dentista o médico le indiquen lo contrario).

Un buen cepillado y el uso de hilo dental eliminarán todos los restos de barniz Tastytooth de los dientes una vez finalizado el tratamiento. Después del cepillado, los dientes retomarán su aspecto y brillo normal.

DFU 90785 031748 Rev1 PDF

ES

Premier® Tastytooth™ Varnish

Barniz de fluoruro sódico al 5%

Instrucciones para el cuidado del paciente después del tratamiento

Su dentista/higienista bucal le ha aplicado una capa terapéutica de barniz Tastytooth sobre la superficie de varios dientes. Lo podrá notar como una delgada película blanca sobre la superficie del diente. El residuo de la película es temporal y debe dejarlo para obtener los mejores resultados terapéuticos en las áreas tratadas.
A fin de obtener el máximo beneficio de la aplicación del barniz, le recomendamos lo siguiente:

- El barniz Tastytooth debe permanecer en los dientes aproximadamente de 4 a 6 horas. No se cepille los dientes ni use hilo dental durante este período de tratamiento.
- Ingiera alimentos blandos y evite las bebidas calientes y los productos que contengan alcohol durante el período de tratamiento.
- Evite productos con fluoruro como pastas, geles y enjuagues bucales. Al día siguiente, podrá reanudar la higiene bucal normal.
- El uso de fluoruro suplementario recetado debe interrumpirse de 2 a 3 días después del tratamiento (a menos que su dentista o médico le indiquen lo contrario).

Un buen cepillado y el uso de hilo dental eliminarán todos los restos de barniz Tastytooth de los dientes una vez finalizado el tratamiento. Después del cepillado, los dientes retomarán su aspecto y brillo normal.

DFU 90785 031748 Rev1 PDF